

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در مورد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.  
**راهنمایی های عمومی**

- قبل از مصرف در مورد وجود هر نوع حساسیت به این دارو یا داروهای مشابه، همچنین حساسیت به غذاها و مواد محافظ با پزشک خود مشورت نمایید.
- چنانچه مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، کبدی، کلیوی، پرکاری های غدد فوق کلیوی، بیماری های دستگاه گوارش، پرکاری و یا کم کاری غده تیروئید هستید پزشک خود را مطلع سازید.
- دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف کرده و دوره درمان را کامل کنید، در صورت بهبودی مصرف دارو را قطع نکرده و با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- این دارو را به نهانگام مصرف غذا و یا بعد از غذا به همراه یک لیوان آب میل کنید.

#### **مصرف در دوران بارداری و شیردهی**

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است.

#### **مشدخارها**

- از مصرف هر نوع داروی OTC (بدون نیاز به نسخه پزشک) همانند آسپرین، داروهای سرماخوردگی و داروهای کنتول کننده اشتها بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.
- در صورت داشتن علائم نشان دهنده کاهش قند خون مانند: گیجی، اضطراب، خواب آلودگی، تاری دید، تعریق سرد، گرسنگی پیش از حد، سردرد، تهوع، افزایش ضربان قلب و ضعف مفرط سریعاً قند و یا نوشابه های حاوی قند میل کنید.
- از مصرف الکل و سایر فرآورده های الکلی پیرهیزید.
- مرأقب علائم افزایش قند خون خود باشید و در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه کنید:  
تشنجی بیش از اندازه، خستگی، درد معده، تکرر ادرار، خشکی دهان، کاهش اشتها، خشکی و قرمزی پوست و تنفس عمیق و سریع.

#### **مقدار و نحوه مصرف دارو**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک با توجه به شرایط جسمی و بیماری تعیین می کند لذا تبعیت از دستور پزشک معالج الزامی است.

#### **عوارض جانبی**

- هر دارو به مراتز اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.
- تغیر طعم دهان، نشخ، سردرد، کاهش اشتها، تهوع، کم شدن وزن، تاری دید، گیجی، سردی پوست، کاهش قدرت تمرکز، تنفس کوتاه و سریع، درد یا اسپاسم عضلانی، ضعف و خواب آلودگی غیر عادی.

#### **مسوومیت**

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

#### **شرایط تگهداری**

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰°C درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

#### **بسته بندی**

این دارو به صورت قرص های حاوی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم ماده موثره متفورمین هیدروکلراید با نام تجاری ریوفاژ® توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید می شود.

هر ۵۰ قرص در یک بلیستر و هر ۱۰۰ بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.