

قرمن آکاربوز

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا نوصیه مصرف آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً دبورتیکهای تیازبزدی، کورتیکوستروئیدها، فنتوتیازینها، داروهای تبروئیدی، استروژنها، داروهای ضد بارداری خوارک،

فن توتین، اسید نیکوتینیک، سپاتومیمتیکها، بلوکرهای کاتالبای کلسمی ایزوپیازیدها، ذغال فعال، پانکراتین با دایجستیو و دیگوکسین.

- در صورت اینجا به بیماری های دیگر خصوصاً بیماری های کلیوی

- در صورت اینجا به بارداری و شیردهی

- در صورت باردار بودن یا قصد به بارداری و شیردهی

۲- قرص های آکاربوز را حتماً با شروع اولین لقمه غذا و حتماً با هر وعده غذا مصرف کنید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

دوza اوایله: دوز اوایله نوصیه شده جهت مصرف آکاربوز ۵۰ میلی گرم سه بار در روز می باشد.

دوza نگهداری: پس از برقراری دوز اوایله می توان طی مدت ۴-۸ هفته دوز دارو را به ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم سه بار در روز افزایش داد. معمولاً دوز بالاتر از ۵۰ میلی گرم سه بار در روز فقط برای افراد بالای ۶۰ کیلوگرم توصیه می شود.

هنگامیکه به یک دوز موثر و قابل تحمل رسیدید حتماً آنرا حفظ کنید.

تحویل:

۱- حداکثر دوز دارو برای افراد کمتر از ۶۰ کیلوگرم ۵۰ میلی گرم سه بار در روز و برای افراد بالای ۶۰ کیلوگرم ۱۵ میلی گرم سه بار در روز می باشد.

۲- بیمارانی که از این دارو همراه با سایر داروهای ضد قند استفاده می کنند باستثنی تغییر دوز در آنها انجام شود. این کار به دستور پزشک انجام می شود.

۳- قرص های آکاربوز با استثنای حتماً سه بار در روز در ابتدای غذا خوردن در هر وعده میل شوند.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری نوصیه نمی شود مگر آنکه نیاز به مصرف آن از جانب پزشک متخصص تایید شده باشد.

مصرف این دارو در دوران شیردهی نوصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکنست باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض دریک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید:

درد شکم، اسهال، نفخ، کاهش همتوکریت، کاهش کلسمی سرم، کاهش ویتامین B6 پلاسما، علائم از دیاد حساسیت مثل راشهای پوستی و ادم.

هشدارها:

۱- به هنگام مصرف توان این دارو با سایر داروهای ضد قند خون، حتماً به عارضه کاهش قند خون توجه کنید.

۲- مصرف این دارو می تواند موجب تغییر در برخی نتایج تست های آزمایشگاه شود، لذا پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه کنید.

۳- به هنگام قرار گرفتن در شرایط استرس مثل تپ، ترونما، غفت و یا جراحی احتمال از دست رفتن کنترل کلوكز خون وجود دارد، لذا پزشک خود را از موضوع آگاه کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر دارو خصوصاً دبورتیکهای تیازبزدی، کورتیکوستروئیدها، فنتوتیازینها، داروهای تبروئیدی، استروژنها، داروهای ضد بارداری خوارک، فن توتین، اسید نیکوتینیک، سپاتومیمتیکها، بلوکرهای کاتالبای کلسمی ایزوپیازیدها، ذغال فعال، پانکراتین، دایجستیو و دیگوکسین موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

بسته بندی:

این دارو به صورت قرص های های سفید رنگ بوده و دو دوز ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی ماده موثره آکاربوز توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید و عرضه می گردد.

هر ده قرص دریک بلیسترو و هر ۳ بلیسترو به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.