



## قرص استامینوفن / کدئین

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذاز مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

### راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

کودکان و افراد سالخورد، در درون حاملگی و باشیرده، در صورت مصرف داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، نالترکسون، داروهای حاوی الکل، زیدوودین، در صورت ابتلا به بیماری‌های مانند اعتیاد به الکل یا مصرف آنتی بیوتیک، ابتلا به اسهال در صورت مسمومیت، آسم و دیگر مشکلات تنفسی، بیماری‌های کبدی، هپاتیت ویروسی و ورم روده.

در هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه نمایید:

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را میل نمایید و لی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت بعدی را طبق معمول میل نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.

دارو را بیش از مقدار تومیه شده مصرف ننمایید و بدون تجویز پزشک دوز مصرفی را بیشتر ننمایید.

شرابی نگهداری صحیح دارو را رعایت کنید.

### موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگ‌ها و مواد محافظ با پزشک خود مشورت نمایید.

### مقدار و نحوه مصرف:

ضد درد برای پزرسالان ۱ یا ۲ قرص هر ۴ ساعت بر اساس نیاز بیمار

ضد درد برای کودکان، مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می‌شود.

### صرف در دروان بالداری و شبدهی:

این دارو از جفت عبور کرده و در شیر ترشح می‌شود لذا مصرف این دارو در این شرایط خنما با تجویز پزشک متخصص صورت گیرد.

### عوارض جانبی:

هر دارو به موazات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر یک از اوارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

اختلالات تنفسی، واکنش‌های حساسیتی، کیمی، تشنج، توهمن، افسردگی روانی و یا سایر علائم مسمومیت سیستم عصبی آگر انولوسیتوز، مسمومیت کبدی، افزایش فشار خون، تحریک سیستم عصبی مرکزی به خصوص در کودکان، اختلالات مرکزی، عملکرد کلیوی و کاهش تعداد پلاکت‌های خون.

### تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهایی نظر الکل، تضعیف کننده‌های آنتی‌تیزم منوآین اکسیداز، ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای، زیدوودین، نالترکسون، آسپرین، سالیسیلات‌ها و سایر داروهای ضد التهاب استرتوونیدی پزشک خود را مطلع سازید.

### احتیاطات:

در صورت بروز گیجی، خواب آلودگی و سبکی سر احتیاط نمایید.

به هنگام بلند شدن ناگهانی اختیاط نمایید و در صورت احساس تبعه، استفراغ و گیجی دراز بکشید. از مصرف نوشیدنی‌های الکلی خودداری نمایید. قبل از انجام هر کوچه اعمال جراحی (شامل جراحی‌های دندان) یا درمان اورژانسی پزشک را از مصرف دارو مطلع سازید.

### مشدادرها:

صرف استامینوفن در طولانی مدت و یا دوز مصرفی زیاد به کبد آسیب می‌رساند.

از مصرف آسپرین، دیگر سالیسیلات‌ها و سایر داروهای ضد التهاب استرتوونیدی به همراه دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنید.

### شرابی نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

### بسنده بندی:

این دارو به صورت قرص‌های خط دار حاوی ۳۰۰ میلی گرم ماده موثره استامینوفن و ۲۰ میلی گرم ماده موثره کدئین فسیفات توسط شرکت داروسازی فانک‌شیمی پارس تولید می‌شود.

هر ده قرص در یک بلیستر و هر ۱۰ بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می‌گیرد.

Acetaminophene / Codeine Tablet