

## قرص استامینوفن / کافئین

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

### راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً داروهای متوکلوپرامید، پروبنسید، کلستیرامین، داروهای حاوی الکل و داروهایی که مسمومیت بالقوه کبدی دارند.
- در صورت ابتلا و یا سابقه ابتلا به هرگونه بیماری دیگر خصوصاً بیماری های کبدی و بیماری های کلیوی.

### مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

دوز دارو بر اساس استامینوفن تنظیم می شود. لذا بسته به شدت بیماری در بزرگسالان میتوان تا ۸ قرص در روز در فواصل ۴-۳ ساعته تجویز نمود.

مصرف این دارو در بیماران زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری باید با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضار احتمالی آن برای جنین و با تجویز پزشک متخصص باشد.

به دلیل احتمال ترشح این دارو در شیر و احتمال ایجاد عوارض برای نوزاد مصرف این دارو در مادران شیرده توصیه نمی شود.

### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض مشاهده شده با مصرف این دارو عبارتند از: ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، پانسیتوپنی، نوتروپنی، آکراتولوسیتوز، راشهای پوستی، واکنشهای حساسیتی، آسیب کبدی، نکروز کلیوی، نفروپاتی، آسم، خارش، تنگی نفس، افت فشار خون، آتزیوادم، عدم تحمل دارو، افزایش خواب آلودگی در طول روز و بیماری های قلبی-عروقی.

## هشدارها:

۱. مصرف این دارو در بیماران با نارسایی شدید کبدی توصیه نمی شود.
۲. مصرف این دارو در بیماران با نارسایی کلیوی توصیه نمی شود.
۳. مصرف این دارو در بیماران که از داروهای حاوی الکل استفاده می کنند توصیه نمی شود.
۴. قطع مصرف این دارو می تواند باعث سردرد ناشی از وابستگی به کافئین شود.

### تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً داروهای متوکلوپرامید، پروبنسید، کلستیرامین، داروهای حاوی الکل و داروهایی که مسمومیت بالقوه کبدی دارند، موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

### شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نکنید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نکنید.

### بسته بندی:

این دارو به صورت قرص های سفید بیضوی حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن و ۶۵ میلی گرم کافئین انیدر توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید می شود.

هر ده قرص در یک بلیستر و هر ۵ بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.