

قرمن آتنولول

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا نوبمیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

- راهنمایی های عمومی :
- ۱ - قبیل از مصرف این دارو در موارد زیر با پژشک خود مشورت کنید :
- در صورت داشتن سایه حساسیت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً رزپرین، همارکننده های کاتالهای کلسیم مثل نیفیدیپین، کلونیدین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مثل ابیپرو芬 و آیندومتاسین.
- در صورت باریکی دارو را نظیر نارسایین کلیوی، آرینتمیاهای قلبی و شوکهای کاردیوژنیک.
- ۲ - اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، پس از یادآوری بالا فاصمه آنرا مصرف کنید، ولی چنانچه نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی بود از مصرف این دوز منظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پژشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل می باشد :

الف : درمان فشار خون : دوز اوایله آتنولول در درمان فشار خون 50 mg میلی گرم می باشد که به مصرف یکبار در روز به تنهایی یا همراه با داروهای دیورتیک مصرف می شود. اثر کامل دارو، یک تا دو هفته پس از مصرف دارو مشاهده می شود. در صورت عدم پاسخدهی کامل مقدار مصرف را می توان 100 mg میلی گرم در روز افزایش داد. مقادیر بالاتر از 100 mg میلی گرم در روز اثر اضافی نشان نداده است.

ب : درمان آنژین قفسه مدری : دوز اوایله آتنولول در درمان این ناراحتی 50 mg میلی گرم است که به مصرف یک قرص در روز مصرف می شود. در صورتیکه پس از یک هفته پاسخ مناسبی دریافت نشد دوز دارو را می توان 100 mg میلی گرم یکبار در روز افزایش داد. برخی از بیماران ممکنست به 200 mg میلی گرم در روز نیاز داشته باشند.

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است. مصرف این دارو در دوران شیردهی می تواند باعث برادیکاردی و هیپوگلیسمی در نوزادان شود.

عواض جانبی :

هر دارو به موارز اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز مرغعه ای با پژشک خود مشورت کنید.

اعلی عوارض جانبی این دارو تقویت می کند، افت فشار خون و ضعیتی، درد پا، نارسایین قلبی، بلوک قلبی، تاکیکاردی فوق بطيء، فيبریلاسیون دهیزی، فلوتوردهیزی، تاکیکاردی بطی، افمارکتوس مجده قلبی، ایست کلی قلبی، ایست غیر کشده قلبی، شوک کاردیوژنیک، نواع آریتمی، سرگیجه، سردد خفیف، اسپاس خستگی، ضعف، تائزوی، دیرسیون، اسهال، تهوع، وزوز کردن به هنگام تنفس، دیسپنه، اسپاسم بروننشا، آمیولی ریوی، آگرانونلوسیتوز، تب، درد بدن و گلو، اسپاسم مارنژ، ضعف تنفسی، ترمومیوز در عروق مزانتریک، کولیت ایسکمیک، بالا رفتن بیالی و بین، سردرد، توهم، ناتوانی جنسی، جنون، پورپورا، آلوپسی برگشته پذیر، ترموموستیتیپی، مشکلات دید، خشکی دهان.

هدارها :

- مصرف آتنولول در بیماران مبتلا به برادیکاردی، بلوک قلبی با درجه بالاتر از یک، شوک کاردیوژنیک و نارسایی قلبی ممنوع است.
- مصرف آتنولول در بیماران با سایقه حساسیت در مصرف این دارو، ممنوع می باشد.
- بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی نیاز به دوزهای کمتر دارند.
- بیمارانی که قبلا از یک بتابلکر استفاده می کرده اند بایستی درمان را با دوزهای پانیتر شروع کنند.

شرابیت نگهداری :

این دارو را در دمای کمتر از 30°C درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

این دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی :

آتنولول به مصرف قرمهای روكشدار حاوی 50 mg ماده موثره توسط شرکت داروسازی فانک شیمی پارس تولید می شود.

قرمهای 50 mg میلی گرمی به رنگ نارنجی می باشند. هر 10 mg قرص درون یک بلیستر و هر ده بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه مقوایی قرار می گیرد.

قرمهای 100 mg میلی گرمی نیز به رنگ نارنجی می باشند. هر 10 mg قرص درون یک بلیستر و هر ده بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه مقوایی قرار می گیرد.