



قرص متوکاربامول ۵۰۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران جدا خودداری کنید. قبل از مصرف این دارو برکه راهنمای مصرف را به دقت مطالعه نمایید.

– راهنمایی های عمومی :

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید :

۱-۱ حساسیت به داروها و مواد دیگر از قبیل رنگ ها، غذاها و ...

۱-۲ مصرف سایر داروهای تضعیف سیستم عصبی مرکزی

۱-۳ سابقه سرع، تشنج، نارسایی های کبدی و کلیوی

۲- در صورت فراموش کردن یک دوز، تا حدود ۱ تا ۲ ساعت بعد از زمان معین می توانید آن را مصرف کنید در غیر این صورت دارو را تا زمان دوز بعدی مصرف نکرده و از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.

۳- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

– موارد منع مصرف :

سابقه حساسیت به دارو

– مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

اطلاعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در زمان بارداری وجود ندارد لذا این دارو در این دوران باید با احتیاط و محدود به موارد خاص باشد.

امکان ترشح این دارو به شیر ثابت نشده است لذا مصرف این دارو در این دوران باید با احتیاط صورت پذیرد.

– هشدارها :

این دارو ممکن است موجب گیجی، خواب آلودگی و عدم هماهنگی عملکرد عضلات شود، لذا در صورت بروز این علائم از رانندگی، کار با ماشین آلات و سایر فعالیت هایی که نیاز به دقت و تمرکز دارند خودداری نمایید.

– مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می شود ولی مقدار مصرف معمول این دارو به این صورت است:

۱- دوز بزرگسالان به عنوان شل کننده عضلات اسکلتی: در شروع ۱/۵ گرم چهار بار در روز برای ۴۸ تا ۷۲ ساعت سپس ۷۵۰ میلی گرم هر چهار ساعت به عنوان دوز نگهدارنده. در موارد خیلی حاد دوز ابتدایی میتواند تا ۸ گرم در روز افزایش یابد.

در مواردی که دارو به عنوان درمان کمکی کزاز استفاده می شود دوز مصرفی می تواند با توجه به پاسخ بیمار تا ۲۴ گرم در روز افزایش یابد.

۲- دوز اطفال: ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال به اثبات نرسیده است.

– عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

با شیوع بیشتر: خواب آلودگی، گیجی، سردرد، تاری دید، دوبینی

با شیوع کمتر: کند شدن ضربان قلب، نیستناگموس، فلاشینگ و قرمزی صورت، تهوع و استفراغ، بی اشتها، تب و راش های جلدی (آلرژیک)، گرفتگی بینی

– تداخلات دارویی و تغییر در پاسخ تست های آزمایشگاهی :

مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی و الکل میتواند موجب تشدید ضعف عملکرد این سیستم شود. متوکاربامول می تواند مانع عملکرد پیریدوستیگمین شود لذا این دارو در بیماران مبتلا به میاستنی گراو که از داروهای آنتی کولین استراز استفاده میکنند باید با احتیاط بسیار مصرف شود.

این دارو ممکن است در بعضی بیماران موجب تغییر رنگ ادرار به قهوه ای، سیاه، آبی و یا سبز شود.

– مسمومیت :

اطلاعات کافی در مورد مسمومیت حاد با این دارو موجود نیست و علائم مسمومیت بیشتر به صورت گیجی و خواب آلودگی شدید بروز میکند. در صورتیکه اطلاع پیدا کردید بیمار دارو را بیش از حد مصرف کرده فوراً با یک مرکز کنترل مسمومیت تماس بگیرید.

– شکل دارویی :

متوکاربامول در بلیسترهای ده عددی و جعبه های صد عددی همراه برگه راهنمای مصرف دارو عرضه شده است.

– شرایط نگهداری :

۱- دارو را در بسته بندی خود، دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

۲- دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری کنید.

Met-500/L

Methocarbamol 500 Tablet