



ساعت رساند.

در درمان زخم معده کودکان ۱۶-۱ ساله دوز پیش‌نهادهی ۵/۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر روز به هنگام خواب یا در دو دوز مختلف می باشد. بیشینه مصرف دارو در این افراد ۴۰ میلی گرم در روز می باشد. دوز توصیه شده در درمان رفلاکس معده و مری کودکان ۱۶-۱ ساله یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز به هنگام خواب یا در دو دوز مختلف می باشد. بیشینه مصرف دارو در این افراد، ۴۰ میلی گرم در روز می باشد.

توجه:

۱- این دارو را می توان به همراه آنتی اسیدها مصرف کرد.

۲- دوز دارو را باید در بیمار ان مبتلا به نارسایی کلیوی کاهش داد.

- عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ایی با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید.

این عوارض عبارتند از: سردرد، سرگیجه، بیبوست، اسهال، تب، چاقی، آریتمی، طپش قلب، یرقان کولستاتیک، هیپاتیت، تغییر در آنزیمهای کبدی، تهوع، استفراغ، نارضایتی، بی اشتها،ی، خشکی دهان، آگرانولوسیتوز، پانسیتوپنی، بی خوابی، خواب آلودگی، دپرسیون، اسپاسم برونشها، راشهای پوستی و ترشحات چشم.

- مسمومیت:

در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو بیمار را هر چه سریعتر به مرکز درمانی برسانید.

- تداخل دارویی:

هیچگونه تداخل دارویی از این دارو گزارش نشده است.

- شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگه داری کنید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

- بسته بندی:

قرص های فاموتیدین به صورت قرص های حاوی ۲۰ و ۴۰ میلی گرم فاموتیدین توسط شرکت داروسازی فانتک شیمی پارس تولید و عرضه می گردد.

قرص های ۲۰ میلی گرم به رنگ صورتی بوده، هر ۱۰ عدد قرص درون یک بلیستر و هر سه بلیستر به همراه یک بروشور داخل یک جعبه قرار می گیرد.

قرص های ۴۰ میلی گرم به رنگ قرمز بوده، هر ۱۰ عدد قرص درون یک بلیستر و هر سه بلیستر به همراه یک بروشور داخل جعبه قرار می گیرد.

Famotidine Tablet



قرص فاموتیدین

دسته دارویی:

فاموتیدین از مهارکننده های گیرنده های H2 هیستامینی بوده و باعث کاهش ترشحات معده می شود.

- راهنمای عمومی:

۱- قبل از مصرف دارو، موارد زیر را به داروساز یا پزشک خود اطلاع دهید.

۱- سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر مواد، داروها و یا غذاها.

۲- ابتلا یا سابقه نارسایی کلیوی

۲- در صورت فراموش کردن یک دوز از دارو به محض یادآوری، آن را مصرف کنید مگر اینکه نزدیک به زمان دوز بعدی باشد که در این صورت دارو را مصرف نکرده و از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.

- موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در افرادی که نسبت به آن یا سایر داروهای مشابه حساسیت دارند ممنوع می باشد.

- مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

ایمنی مصرف این دارو در بارداری به اثبات نرسیده است، لذا مصرف آن باید محدود به مواردی باشد که منافع حاصل بیشتر از خطرات احتمالی برای جنین باشد. در طبقه بندی FDA این دارو در گروه B قرار دارد.

به دلیل ترشح این دارو در شیر مادر، مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است و باید بین مصرف دارو و یا شیردهی یکی را انتخاب کرد.

- هشدارها:

به دلیل امکان ایجاد آثار جانبی شدید در سیستم اعصاب مرکزی مصرف این دارو در بیمار ان مبتلا به نارسایی کلیوی بایستی با احتیاط فراوان انجام شود.

- مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می شود اما مقادیر متداول مصرف این دارو به شرح زیر است:

در درمان کوتاه مدت زخم فعال دئودنوم دوز پیشنهادی در بزرگسالان ۴۰ میلی گرم یکبار در روز به هنگام خواب می باشد. اغلب بیمار ان طی چهار هفته درمان می شوند. به ندرت لازم است فاموتیدین را در این دوز برای بیش از ۸-۶ هفته مصرف کرد. درمان با رژیم ۲۰ میلی گرم دو بار در روز نیز موثر می باشد. جهت درمان حمایتی ۲۰ میلی گرم یکبار در روز به هنگام خواب توصیه می شود.

در درمان زخم معده ابتدایی دوز توصیه شده در بزرگسالان ۴۰ میلی گرم یکبار در روز به هنگام خواب توصیه می شود.

دوز توصیه شده در درمان رفلاکس معده و مری بزرگسالان، ۲۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۶ هفته می باشد. دوز توصیه شده برای درمان ازوفازیت بزرگسالان که همراه با زخم و آسیب می باشد، ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۱۲ هفته می باشد.

در بزرگسالانی که مبتلا به بیماری های ترشح بیش از حد اسید معده هستند (مثل سندروم زولینگر الیسون) دوز ابتدایی پیشنهادی ۲۰ میلی گرم هر ۶ ساعت می باشد. در برخی از بیمار ان می توان این دوز را افزایش داده و به ۱۶۰ میلی گرم هر ۶

Famotidine Tablet