


Mebeverine
Size: 150*162 mm
Pantone: 7460 C 
Font: B Yekan+ Size: 8.6
Confirm Date:



قرص مبورین هیدروکلراید

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورت ابتلا به هرگونه بیماری دیگر خصوصاً ناراحتی های قلبی، نارسایی کبدی و کلیوی، فلج عضلات روده، فیبروز کبد، عدم تحمل لاکتوز و سندرم روده تحریک پذیر .

مقدار و نحوه مصرف :

جهت درمان حالات اسپاسمودیک عضلات دستگاه گوارش مقدار ۱۳۵ میلی گرم از دارو سه بار در روز ۲۰ دقیقه قبل از غذا مصرف می شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید طبق نظر پزشک و با سنجیدن منافع مصرف آن در مقابل مضار آن باشد.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود ، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.
اکثر عوارض گزارش شده از مصرف این دارو بصورت خفیف تا متوسط بوده و با قطع مصرف دارو قابل برگشت هستند.
عوارض گوارشی، سرگیجه، سردرد، کاهش ریتم قلب، سوزش معده، یبوست، بیقراری، واکنشهای حساسیتی خفیف و در موارد نادر آتزیوادم.

هشدارها:

- مبورین در کسانی که حساسیت شناخته شده به این دارو و یا داروهای مشابه داشته باشند منع مصرف دارد.
- مصرف این دارو در افراد مبتلا به فلج عضلات گوارشی ممنوع است .
- این دارو در افرادی که نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، فیبروز کبدی، سندرم روده تحریک پذیر و عدم تحمل لاکتوز دارند باید با احتیاط مصرف شود.

شرایط نگهداری:

این دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
این دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی :

قرص مبورین به صورت قرصهای روکشدار حاوی ۱۳۵ میلی گرم ماده موثر مبورین هیدروکلراید توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید می شود .
قرصها به رنگ سفید می باشد، هر ۱۰ قرص درون یک بلیستر و هر ده بلیستر به همراه بروشور درون جعبه قرار می گیرد.

Mebeverine HCL Tablet