

قرص کوتیاپین

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سبقه حساسیت به کوتیاپین یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی.
- در صورت مصرف داروهای خاص درمان VII (مانند مهارکننده های پروتئاز)
- در صورت مصرف داروهای ضد قارچ آزول مانند کوتونازول و ایترکوتونازول
- در صورت مصرف آنتی بیوتیک های ارینتروماسین و یا کلاریتوماوسین
- در صورت مصرف داروی نفازودون در درمان افسردگی
- در صورت ابتلا به فراموشی در افراد مسن، داشتن فشارخون پایین، ابتلا به بیماریهای قلبی یا عروقی، داشتن مشکلات کبدی، ساقه سکته، ساقه هر گونه کاهش تعداد گلوبولهای سفید، ساقه تشنج، ابتلا به دیابت.

نحوه: در صورت بروز علائم دیس—کینزی (حرکات غیر ارادی به ویژه در صورت زبان)، سندروم نرولپتیک بد خیم (تب، تنفس تند، تعریق، سختی عضلات و کاهش هوشیاری). هیپوکالمی و هیپومنیزیمی فوراً پزشک خود را آگاه کنید.

تداءات دارویی:

اگر داروهای زیر را مصرف می کنید، حتماً پزشک خود را مطلع سازید.
فنی تئین، کارا مازپین، سایر داروهای مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی، داروهای آنتی سایکوتیک، ضد افسردگی ها و داروهای خواب آور، داروهای ضد پرفشاری خون و دیورتیک ها

هشدارها:

- این دارو می توان همراه و یا بدون غذا مصرف نمود. قرص ها را با نصف لیوان آب میل کنید. کوتیاپین را همراه با آب گریپ فروت مصرف نکنید.

- از مصرف الکل پرهیز کنید، مصرف همزمان الکل و کوتیاپین باعث احساس سرگیجه می شود.

- این دارو باعث خواب آودگی می شود که ممکن است با ادامه مصرف دارو از بین برود، بتاراین تا زمانیکه این دارو باعث خواب آودگی شما می شود، ازاندگی و کار با ماشین آلات اجتناب کنید.

- کوتیاپین حاوی لاکتوز است. در صورت عدم تحمل برخی قندها، پزشک خود را قبل از مصرف این فرآورده دارویی مطلع کنید.

- در صورت بستگی بودن در بیمارستان کادر درمان را از مصرف کوتیاپین مطلع کنید.

- لطفاً در صورت مصرف هر نوع دارویی حتی داروهای بدون نسخه، پزشک را مطلع کنید.

صرف در دوران بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری یا تمایل به بارداری و یا شیردهی پزشک خود را مطلع کنید.
از مصرف کوتیاپین در دوران شیردهی اجتناب کنید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار و نحوه مصرف را پزشک معالج تعیین می کند اما، مقدار مصرف متداول آغازین عبارت است از:

- در درمان شبیزوفرنی: ۵۰ میلی گرم (دو قرص ۲۵ میلی گرم) در روز اول، ۱۰۰ میلی گرم در روز دوم، ۳۰۰ میلی گرم در روز سوم ۴۰۰ میلی گرم در روز چهارم.

- در درمان مانیا ناشی از افسردگی دو قطبی: ۱۰۰ میلی گرم در روز اول، ۲۰۰ میلی گرم در روز دوم، ۳۰۰ میلی گرم در روز سوم و ۴۰۰ میلی گرم در روز چهارم و در ادامه مقدار مورد نیاز فرد تعیین می گردد. در صورت تردید از پزشک سوال کنید.
کوتیاپین به طور معمول یکبار در شبانه روز به هنگام خواب یا دو بار در روز تجویز می شود.

صرف دارو را حتی در صورت احساس بهبودی بدون دستور پزشک قطع نکنید.
هنگامیکه مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف کنید. سپس مصرف را بر اساس زمان های معمول ادامه دهید. برای جبران دوز فراموش شده مقدار مصرف را دو بار برگیر.

علام مصرف بیش از اندازه:

سرگیجه، خواب آودگی، ضربان تند قلب (تاكیکاردی) و افت فشارخون
اگر بیش از مقدار مصرف تعیین شده دارو مصرف کردید هرچه سریعتر با پزشک خود تماس بگیرید و یا به نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هر کدام از موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

سرگیجه، سردرد و خواب آودگی این عارضه ای ادامه درمان از بین می رود.
خشکی دهان، بیوست، سو، هاضمه، کاهش تعداد گلوبولهای سفید خون، افزایش تعداد ضربان قلب، احساس ضعف، تورم دستها یا پاها، افزایش وزن، گرفتگی بینی، افت فشارخون وضعیتی (بویژه به هنگام شروع درمان)، غش و افزایش مقدار آنژیمهای کبدی (AST، ALT)، تاری دید.

عوارض جانبی که شیوع کمتری دارند:

واکنش های حساسیتی (همانند تورم پوست)، تشنج، افزایش تعداد اوزینوفیل، افزایش کلسترول خون، تری گلیسیریدها و برخی آنژیمهای کبدی

عوارض جانبی نادر:

سندروم با علائم تب، خواب آودگی بسیار شدید، سفتی عضلات، افزایش بسیار زیاد فشارخون یا ضربان قلب و کاهش هوشیاری، نعوذ طولانی مدت و دردناک، برقان، تغییر ریتم ضربان قلب، ضربان قلب نامنظم.

۵- شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

۶- بسته بندی:

قرص های کوتیاپین به صورت قرص های حاوی ۲۵ میلی گرم و ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره کوتیاپین به صورت فومارات توسط شرکت داروسازی فاتکشیمی پارس تولید و عرضه می گردد.
هر ده عدد قرص در یک بیلیستر و هر ۳ بیلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.