



سالمدندان به عوارض هیپرکالمی و افت فشار خون این دارو حساسترند لذا مقادیر مصرف دارو در این دسته از بیماران باید با احتیاط بیشتری تعیین شود.

– عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید.

واکنشهای حساسیتی: آنافیلاکسی، راشهای جلدی، کهیر، واکنش های شبه لوپوس اریتماتوز، سندرم استیونس جانسون، حساسیت به نور

قلبی عروقی: آریتمی، افت فشار خون وضعیتی

خونی: مگالوبلاستوزیس

کلیوی: نارسایی حاد کلیوی، نفریت بینابینی، افزایش BUN و سطوح پلاسماپی کراتینین.

سیستم عصبی مرکزی: ضعف، خستگی، سردرد، گیجی

سایر عوارض: یرقان و تغییر در سطح آنزیم های کبدی، تهوع و استفراغ، خشکی دهان، تاری دید

– تداخلات دارویی و تغییر در پاسخ تست های آزمایشگاهی:

ضد التهاب های غیر استروئیدی: افزایش احتمال بروز نارسایی حاد کلیوی

لیتیم: افزایش احتمال بالا رفتن سطوح خونی لیتیم و بروز سمیت

ACEIS: افزایش ریسک هیپرکالمی

سایر تداخلات: آمانتادین، داروهای کاهنده اسید اوریگ خون، داروهای ضد انعقاد (کومارینی و هپارین)، دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم

– مسمومیت:

علائم مسمومیت حاد با این دارو به صورت تکرر ادرار، تهوع و استفراغ، ضعف، تب و برافروختگی صورت بروز میکند. در صورتی که بیمار دارو را بیش از حد مصرف کرده باشد فوراً با یک مرکز کنترل مسمومیت تماس بگیرید.

در صورت بروز مسمومیت حاد با این دارو کنترل فشار خون و سطوح پلاسماپی الکترولیت ها حیاتی است.

– شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

– بسته بندی:

قرص های تریامترن اچ زرد رنگ بوده و حاوی ۵ میلی گرم ماده موثره تریامترن و ۲۵ میلی گرم هیدروکلروتیازید می باشد که توسط شرکت داروسازی فانتک شیمی پارس تولید و عرضه می گردد.

هر ۱۰ عدد قرص در یک پلیستر و هر ده پلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.

Triamterene-H Tablet



قرص تریامترن – اچ

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

– راهنمایی های عمومی:

۱- قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به داروساز یا پزشک خود اطلاع دهید:

۱-۱- سابقه حساسیت به ترکیبات گوگرد دارو و یا سایر موارد، داروها و یا غذاها.

۱-۲- ابتلا به دیابت و یا سابقه نارسایی های کبدی و کلیوی.

۲- دارو را همراه با یک وعده غذایی و یا شیر مصرف کنید.

۳- در زمان مصرف دارو سعی کنید به مدت طولانی در معرض آفتاب قرار نگیرید و حتی امکان از ضد آفتاب و عینک آفتابی استفاده کنید.

۴- در صورت فراموش کردن یک دوز از دارو به محض یادآوری، آن را مصرف کنید مگر اینکه نزدیک به زمان دوز بعدی باشد که در این صورت دارو را مصرف نکرده و از دوبرابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.

– موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به دارو یا سولفونامیدها و ترکیبات گوگرد دارو، هیپرکالمی (پتاسیم سرمی بالاتر از ۵/۵ میلی اکی والان در لیتر)، نارسایی حاد کلیوی، بیماری های حادی که در آنها احتمال بروز اسیدوز متابولیک یا تنفسی وجود دارد.

– مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

ایمنی مصرف این دارو در بارداری به اثبات نرسیده است، لذا مصرف آن باید محدود به مواردی باشد که منافع حاصل بیشتر از خطرات احتمالی برای جنین باشد. در طبقه بندی FDA این دارو در گروه C قرار دارد. در دوران شیردهی مطالعه دقیق و کنترل شده ای روی ترکیب تریامترن و هیدروکلروتیازید انجام نشده است. تریامترن می تواند در شیر حیوانات ترشح شود و تیازیدها نیز قابلیت ترشح به شیر انسان را دارند، لذا در مواردی که نیاز به مصرف دارو باشد شیردهی باید متوقف شود.

هشدارها:

در شرایط زیر مصرف این دارو باید با احتیاط فراوان باشد:

ابتلا به دیابت، نارسایی های کبدی، اختلالات الکترولیتی، سنگ های کلیوی، نقرس و سطوح بالای اسید اوریگ خون.

تریامترن به عنوان آنتاگونیست فولت عمل کند، لذا می تواند موجب مگالوبلاستوزیس در افرادی که ذخیره فولت کمتری دارند (خانم های باردار و افراد مبتلا به سیروز) شود در این افراد باید از لکوپورین به جای اسید فولیک استفاده کرد.

– مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می شود اما مقادیر متداول مصرف دارو به شرح زیر است:

دوز بزرگسالان: ۱ تا ۲ قرص در روز با توجه به وضعیت و پاسخ دهی بیمار (ممکن است ۱ قرص در روز یا ۱ قرص یک روز در میان نیز برای بعضی از بیماران کفایت کند.)

دوز اطفال: ایمنی مصرف این دارو در اطفال به اثبات نرسیده است.

Triamterene-H Tablet