



قرص ونلافاکسین (بصورت هیدروکلراید)

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی:

- ۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر، با پزشک خود مشورت کنید:
 - در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به ونلافاکسین سایر داروها، غذا، رنگها و مواد مختلف.
 - در صورت نیاز به انجام آزمایشات بالینی.
 - در صورت ابتلا، به هرگونه بیماری کلیوی، کبدی، قلبی، مشکلات بینایی و گلوکوما.
- ۲- در صورت مصرف هرگونه دارو خصوصاً مهارکننده های مونوآمینوآکسیداز، کلوزاپین، وارفارین و یا داروهای با فعالیت سروتونرژیک، داروهایی که باعث دپرسیون سیستم عصبی مرکزی می شوند، سایمتیدین، دیورتیک ها، مکلومیپد، هالوپریدول.
- ۳- این دارو باید همراه غذا میل شود تا عوارض گوارشی آن کاهش یابد.
- ۴- قبل از قطع مصرف دارو حتماً با پزشک خود مشورت کنید.
- ۵- به هنگام مصرف این دارو از رانندگی یا کار با ماشین آلتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.
- ۵- به علت احتمال بروز سرگیجه از حرکات ناگهانی مثل بلند شدن یکباره از حالت خوابیده یا نشسته پرهیز کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را برپزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو بدین صورت می باشد:

دوز توصیه شده در بزرگسالان:

- برای درمان دپرسیون، ۷۵ میلی گرم روزانه در ۲ تا ۳ دوز منقسم مصرف می شود. این مقدار در صورت نیاز و تحمل ممکن است به ۷۵ میلی گرم در هر دوز افزایش یابد و حداکثر به ۲۲۵ میلی گرم روزانه برسد. در بیماران با دپرسیون شدید ممکن است مقدار مصرف دارو به ۳۷۵ میلی گرم در ۳ دوز منقسم افزایش یابد. مصرف این دارو در افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود مگر با تجویز پزشک متخصص و با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل ضررهای مصرف آن.

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود. در صورت نیاز به مصرف دارو باید شیردهی را قطع کرد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

این عوارض عبارتند از: سردرد، افزایش فشار خون، اثرات قلبی و عروقی، عوارض سیستم عصبی مرکزی، مشکلات تنفسی، ادم، خارش یا راش های پوستی، هیپومانیا یا مانیا، تغییرات رفتاری، سرگیجه، اثر روی دستگاه ادراری، رویاهای غیر واقعی، آنورکسیا، اسهال، خشکی دهان، حالت تهوع، طپش قلب، بی خوابی، افزایش تعرق، از دست دادن وزن، تغییر در حسای چشمانی.

هشدارها:

۱- در صورت سابقه ابتلا، و یا بروز هرگونه واکنش حساسیتی به این دارو یا داروهای مشابه حتماً موضوع را به پزشک خود اطلاع دهید.

۲- دارو را بدون نسخه پزشک مصرف نکنید.

۳- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود لذا به هنگام مصرف دارو از رانندگی یا کار با ماشین آلتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند اجتناب کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی، داروهای با فعالیت سروتونرژیک، مهارکننده های مونوآمینوآکسیداز، سایمتیدین، کلوزاپین، وارفارین، دیورتیک ها، مکلومیپد و هالوپریدول موضوع را به اطلاع پزشک خود برسانید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت، درون بسته بندی، ارائه شده نگهداری نمایند.

- این دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی:

قرصهای ونلافاکسین به صورت قرصهای حاوی ۳۷/۵ یا ۷۵ میلی گرم ماده موثره، ونلافاکسین (بصورت هیدروکلراید) توسط شرکت داروسازی فانتک شیمی پارس تولید و عرضه می گردد.

هر ۱۰ عدد قرص درون یک پلیستر و هر ده پلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.

Venlafaxine Tablet