

قرص آزیترومایسین

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

را هنمای عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.

– در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً آنتی اسیدها، دیگوکسین، ارگوتامین، دی‌هیدروارگوتامین، تریازولام، کاربامازپین، سیکلوسپورین، هگزوباریتال و فنی‌توبین.

– در صورت ابتدا به هر بیماری دیگر خصوصاً بیماریهای کبدی.

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، پس از یادآوری بلافاصله آن را مصرف کنید. ولی چنانچه نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی بود از مصرف این دوز صرف نظر کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز دو برابر نکنید.

مقدار و نحوه مصرف :

جهت درمان پنومونی با شدت کم، درمان خط دوم عفونت حلق و گلو و عفونتهای پوست یا ساختمان پوست مقدار ۵۰۰ میلی‌گرم به صورت یک دوز تکی در روز اول که در روزهای دوم تا پنجم با یک دوز ۲۵۰ میلی‌گرمی ادامه می‌یابد تجویز می‌گردد.

در درمان عفونت های دستگاه تنفسی با شدت کم تا متوسط مقدار ۵۰۰ میلی‌گرم در روز به مدت سه روز یا مقدار ۵۰۰ میلی‌گرم بمصورت یک دوز تکی در روز اول که در روزهای دوم تا پنجم با یک دوز ۲۵۰ میلی‌گرمی ادامه می‌یابد تجویز می‌گردد.

در درمان سینوزیت باکتر یایی حاد مقدار ۵۰۰ میلی‌گرم در روز به مدت سه روز مصرف می‌شود .

در درمان شانکر ناحیه تناسلی یک دوز واحد یک گرمی از دارو استفاده می‌شود.

در درمان عفونت های غیرسوزاکی مجاری تناسلی یک دوز واحد یک گرمی از دارو استفاده می‌شود.

در درمان عفونت های سوزاکی مجاری تناسلی یک دوز واحد دو گرمی از دارو استفاده می‌شود.

توجه : قرص های آزیترومایسین را می‌توان همراه یا بدون غذا مصرف کرد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود. چون مطالعات کافی و کنترل شده‌ای از مصرف این دارو در زنان باردار صورت نگرفته است. لذا مصرف آن در دوران بارداری باید طبق نظر پزشک و سنجیدن منافع آن در مقابل مضار آن باشد. مصرف این دارو در دوران شیردهی نیز باید حتما با تشخیص پزشک و با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو و در مقابل مضار آن باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر عارضه‌ای با پزشک خود مشورت کنید.

اکثر عوارض گزارش شده از مصرف این دارو بصورت خفیف تا متوسط بوده و با قطع مصرف دارو قابل برگشت هستند. عوارض گوارشی از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، دردهای شکمی، نفخ، مدفوع خونی، سوء هاضمه، برفان، کولستاتیک، واکنشهای حساسیتی خفیف، حساسیت به نور و در موارد نادر آتزیوادم.

هشدارها:

– آزیترومایسین در کسانیکه حساسیت شناخته شده با اریترومایسین و یا هر ماکرولید دیگر داشته باشند منع مصرف دارد.

– واکنش های آلرژیک بسیار نادر ولی جدی شامل آتزیوادم، و آنافیلاکسی در اثر مصرف این دارو در بعضی از افراد دیده شده است.

– این دارو نباید در افرادی که مشکل و یا نارسایی کبدی دارند مصرف شود.

شرایط نگهداری:

این دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی:

قرص آزیترومایسین بصورت قرص های روکشدار حاوی ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی‌گرم ماده موثره آزیترومایسین (بصورت دی‌هیدرات) توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید می‌شود.

قرص های ۲۵۰ میلی‌گرمی به رنگ قرمز کمرنگ بوده، هر ۶ قرص درون یک بلیستر و هر بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می‌گیرد.

قرصهای ۵۰۰ میلی‌گرمی به رنگ قرمز کمرنگ بوده، هر ۶ قرص درون یک بلیستر و هر بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می‌گیرد.