



## قرص هیدروکلروتیازید

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.

### راهنماییهای عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

– در صورت سابقه حساسیت به هیدروکلروتیازید، تیازیدهای دیگر یا مشتقات سولفونامیدها و یا هر نوع دارو ، غذا ، ماده محافظ و ماده رنگی .

– در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله دیابت، بیماری های کبدی، کلیوی و آنوری (عدم توانایی بیمار در ادرار کردن)

– در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای کاهنده فشار خون، داروهای ضد انعقاد ، داروهای ضد التهاب استروئیدی خصوصاً ایندومتاسین ، داروهای پایین آورنده قند خون ، کلستیرامین و لیتیم

### مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر به صلاحدید پزشک متخصص .

### هشدارها :

– دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمائید.

– در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن دارو را مصرف نمائید ولی اگر به زمان نوبت بعدی زمان زیادی باقی نمانده است از مصرف آن صرف نظر کرده مطابق برنامه معمول عمل کنید و از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری نمائید.

– این دارو پرفشاری خون را درمان نمی کند بلکه آن را کنترل می کند از این رو ادامه مصرف دارو ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.

– دارو را حتی در مواقعی که احساس بهبودی می نمائید مصرف کنید زیرا ممکن است علائم زیادی فشار خون بارز نباشد.

– در صورت مصرف این دارو به عنوان داروی ضد فشار خون رعایت رژیم غذایی کم نمک و کاهش وزن لازم است. دارو را هر روز در وقت معین مصرف کنید.

– افراد سالمند نسبت به اثرات کاهنده فشار خون این دارو حساس ترند.

– در صورت نیاز به عمل جراحی پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمائید.

– بدون هماهنگی با پزشک خود از مصرف همزمان هر داروی دیگر بخصوص داروهای مقلد سمپاتیک با این دارو خودداری نمائید.

Hydrochlorothiazide Tablet



– ضمن درمان با این دارو از قرار گرفتن بیش از حد مقابل نور خورشید یا استفاده از لامپهای خورشیدی خودداری نمائید. – برای جلوگیری از بروز دهیدراسیون در صورت تهوع، استفراغ یا اسهال شدید و تداوم این علائم به پزشک مراجعه نمائید.

### مقدار ونحوه مصرف :

بزرگسالان :

مدر : ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم یک یا دو بار در روز ، یک روز در میان یا یک بار در روز برای ۳ تا ۵ روز هفته. کاهنده فشار خون : ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم در روز بصورت تک دوز یا در دو دوز منقسم.

کودکان :

۱ تا ۲ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بصورت تک دوز یا در دو دوز منقسم .

### عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز هر کدام با پزشک خود مشورت کنید.

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند :

خشکی دهان، افزایش احساس تشنگی ، ضربان نامنظم قلب، تغییرات خلقی و روانی، درد یا کرامپ عضلانی، تهوع یا استفراغ، خستگی یا ضعف غیر عادی، نبض ضعیف، گلو درد و تب، بثورات جلدی یا کهیر، درد شدید معده همراه با تهوع و استفراغ، درد مفاصل، زرد شدن چشمها یا پوست.

عوارضی که در صورت تداوم یا ایجاد ناراحتی نیاز به توجه پزشکی دارند :

کاهش اشتها، کاهش توانایی جنسی، سرگیجه یا منگی هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته، افزایش حساسیت پوست به نور خورشید.

### مسمومیت :

در صورت بروز مسمومیت بیمار را هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

### شرایط نگهداری :

– دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمائید.

– دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمائید.

### بسته بندی:

قرص هیدروکلروتیازید به رنگ سفید بوده و حاوی ۵۰ میلی گرم ماده موثره هیدروکلروتیازید توسط شرکت داروسازی فانتک شیمی پارس تولید می شود.

هر ۱۰ عدد قرص، درون یک بلیستر و هر ۱۰ بلیستر به همراه یک بروشور داخل یک جعبه قرار می گیرد.

Hydrochlorothiazide Tablet