

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

– حساسیت به استامینوفن و ایبوپروفن و هر یک از اجزاء دارو

– در صورت سابقه بیماری کبدی، کلیوی ، قلبی، زخم معده، اعتیاد به الکل، مصرف آنتی بیوتیک، افزایش فشار خون، واکنش حساسیت پوستی(سندرم استیون جانسون )، خونریزی ، کولیت اولسراتیو در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای زیر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید:

الکل، وارفارین، داروهای درمان صرع، کلرامفیکل، متوکلوپرامید، پروپانتیلین، کلستیرامین، پروبنسید، زیدوودین، کوتریموکسازول، ایزونیاژید، داروهای درمان فشار خون، دیورتیک ها ، لیتیم ، متوتروکسات و کورتیکوسترئوئید ها  
**مقدار و نحوه مصرف:**

دارو را با یک لیوان آب میل کنید.

بزرگسالان و بچه های بالاتر از ۱۲ سال ؛ یک قرص هر ۶ ساعت

برای کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود.

**بارداری و شیردهی :**

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی توصیه نمی شود.

**عوارض جانبی :**

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ، ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود ، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از این موارد با پزشک خود مشورت کنید.

تهوع و استفراغ، سردرد، خواب آلودگی، گیجی، کاهش اشتها، سوزش و درد در ناحیه معده، اسهال و یبوست ، کهیر

**هشدار:**

مصرف این دارو در طولانی مدت و با دوز مصرف زیاد ، به کبد و کلیه آسیب می رساند. از مصرف آسپرین و دیگر سالیسیلات ها و یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی به همراه دارو خودداری فرمائید.

**مصرف بیش از حد :**

در صورت مصرف بیش از حد دارو بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال دهید.

**شرایط نگهداری:**

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری نمائید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

**بسته بندی:**

این دارو به صورت قرص روکش دار خط دار ، حاوی ۵۰۰ میلی گرم ماده موثر استامینوفن و ۲۰۰ میلی گرم ماده موثر ایبوپروفن، توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید می شود.

هر ده قرص در یک بلیستر و هر سه بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.