

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

راهنمایی عمومی:

- در صورت حساسیت به این دارو ، غذاها ، رنگ ها و سایر داروها پزشک را مطلع سازید.
- در صورت مصرف بیش از اندازه از دارو (حتی در صورتی که احساس ناراحتی نمی کنید) حتماً با پزشک خود مشورت کنید . مقدار بیش از حد استامینوفن می تواند با تاخیر موجب مدمات کبدی جدی شود.
- در هنگام استفاده از این فرآورده از مصرف نوشیدنی های حاوی الکل خودداری نمایید.
- مصرف این دارو در افراد زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.
- مصرف مقدار زیاد کافئین می تواند موجب اختلال در خواب ، لرزش و احساس ناراحتی در قفسه سینه شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

با توجه به وجود کافئین ، این دارو نباید در دوران بارداری و شیردهی مصرف شود. قبل از مصرف دارو حتماً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

موارد احتیاط:

در موارد زیر از مصرف دارو خودداری کنید:

- حساسیت به استامینوفن ، کافئین ، کلرفنیرآمین مالئات و ویتامین ث و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن .
- در صورت وجود بیماری های کبدی و کلیوی (شامل بیماری کبد الکلی) ، آریتمی قلبی و زخم معده حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورت مصرف داروهای زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

داروهایی که باعث تضعیف سیستم اعصاب مرکزی می شوند.

کاربامازپین ، فنی توفین ، فنو باربیتال ، زیدوودین ، ضدانقادها مثل وارفارین و داروی ضد دردی که در فواصل منظم روزانه مصرف می شوند.

مقدار و نحوه مصرف :

- مقادیر ذکر شده در زیر مقدار متوسط مصرف است و مقدار دقیق را پزشک تعیین می کند .
- بزرگسالان و کودکان بیش از ۱۲ سال دو عدد کپسول ۳ بار در روز در صورت نیاز مصرف شود.
- کپسول ها را همراه با یک لیوان آب مصرف نمایند.
- از مصرف بیش از ۸ عدد کپسول در ۲۴ ساعت خودداری کنید.
- از مصرف زیاد نوشیدنی های حاوی کافئین مانند قهوه و چای خودداری کنید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود . لیکن در صورت بروز هرکدام از عوارض زیر مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک تماس بگیرید.
- آریتمی ، تپش قلب ، سرگیجه، بی خوابی، بثورات پوستی و خشکی دهان.

علائم مصرف بیش از حد این دارو، به شرح زیر می باشد:

- افزایش تعریق، بی قراری، تهوع، در صورت داشتن هر یک از این علائم، بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری :

- ۱-دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود .
- ۲-دور از نور ، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایند.
- ۳-از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:

- این دارو به شکل کپسول های قرمز- نارنجی حاوی ۲۰۰ میلی گرم استامینوفن ، ۲۵ میلی گرم کافئین، ۲/۵ میلی گرم کلرفنیر آمین مالئات و ۱۵۰ میلی گرم ویتامین ث می باشد که توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید و عرضه می گردد. هر ۱۰ عدد کپسول در یک بلیستر و هر دو بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.