

## راهنمایی های عمومی :

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

## قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :

- در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.
- در صورتی که هرگونه داروی دیگری را مصرف می کنید یا قصد استفاده از هرگونه داروی بدون نسخه را دارید.
- در صورت ابتلاء به هرگونه بیماری خصوصاً نارسایی کبدی یا کلیوی، زخم معده هیپرتیروئیدیسم، افزایش فشار خون، آریتمی قلبی یا سایر بیماری های قلبی- عروقی و تشنج.

## توجه :

- اگر طی چند روز علایم بیماری بهبود نیافته و یا بدتر شد پزشک خود را مطلع سازید.
- از افزایش ناگهانی دوز دارو و یا قطع ناگهانی مصرف دارو بدون نظر پزشک جدا خودداری نمایید.
- در صورت داشتن سابقه هرگونه تشنج یا تحت درمان بودن با داروهای ضد تشنج حتماً پزشک خود را مطلع فرمایید.
- دارو را همراه با فرآورده های حاوی استامینوفن مصرف نکنید.
- دارو را همراه با غذا و یک لیوان پر از آب میل نمایید.

## مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:  
با توجه به اینکه کپسول ها حاوی ۳ ماده موثره هستند دوز دارو باید با توجه به هر ۳ ماده موثره تنظیم شود . در درمان دردهای خفیف تا متوسط تعداد یک کپسول هر ۸ ساعت مصرف می شود . در صورت نیاز بر اساس شدت درد و تحمل بیمار این مقدار قابل افزایش است .

## مصرف در بارداری و شیردهی :

مطالعات دقیق و کنترل شده ای در زنان باردار در مورد اثرات این دارو صورت نگرفته است و به همین خاطر این دارو در صورتی باید در زنان باردار مصرف گردد که منافع آن در مقابل مضار آن سنجیده شود .  
مصرف این دارو در مادران شیرده با دوزهای معمول بلامانع است .

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه ممکن است همه عوارض مربوط به یک دارو در بیمار دیده نشود، با این حال در صورت بروز هرگونه عارضه جدی با پزشک یا داروساز تماس بگیرید.

عوارض این دارو مجموعه‌ای از عوارضی است که ممکن است به صورت تک تک توسط مواد موثره این دارو ایجاد شود.

این عوارض عبارتند از :

ائوزینوفیلی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، پانسیتوپنی، آگرانولوسیتوپنی، راشهای پوستی، آسیب کبدی و کلیوی، آسم، تحریک دستگاه گوارش، تحریک سیستم اعصاب مرکزی، تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، بی خوابی، سرد درد، تشویش، لرزش، تپش قلب، تشنج و پانکراتیت.

عوارض مصرف بیش از حد دارو :

-در صورت مصرف بیش از حد مقادیر توصیه شده، بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.

-صرف زیاد استامینوفن میتواند باعث سمیت کبدی و تخرب کلیوی شود.

شرایط نگهداری :

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

کپسول پاناتک® به رنگ سفید صورتی بوده و حاوی ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن، ۴۰ میلی گرم کافئین و ۲۰۰ میلی گرم ایبوپروفن می باشد که توسط شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس تولید می گردد.

هر ۱۰ عدد کپسول پاناتک® درون یک بلیستر و هر سه بلیستر به همراه یک بروشور داخل یک جعبه قرار می گیرد.