

گپسول گاباپتین



Gabapentin Capsule

ضد صرع، ضد دردهای عصبی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

- راهنمایی‌های عمومی:

۱ - در صورت حساسیت به این دارو، غذاها، رنگ‌ها، یا مواد محافظ و یا حیوانات پزشک را مطلع سازید.

۲ - کودکان و سالخوردگان به عوارض جانبی ناشی از این دارو حساس‌تر هستند.

۳ - در صورت مصرف داروهای زیر پزشک را مطلع سازید:

آلومنینیوم کربنات، داروهای حاوی املاح آلومنینیوم، منیزیم کربنات، منیزیم هیدروکساید، اکسید منیزیم، منیزیم تری سیلیکات.

۴ - در صورت وجود بیماری‌ای بخصوص بیماری کلیوی حتماً پزشک را مطلع سازید.

۵ - دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.

۶ - این دارو ممکن است همراه با غذا یا بدون غذا و یا با معده خالی مصرف شود.

۷ - در صورتی که این دارو را ۳ بار در روز مصرف می‌کنید، فاصله بین دو بار متوالی بیش از ۱۲ ساعت نشود.

۸ - اگر در بلعیدن گپسول مشکل دارید، می‌توانید هر بار محتویات گپسول را در زمان مصرف در آب سبب حل و میل کنید. از تهیه محلول برای دفعات بعدی و نگهداری آن برای مصرف بعدی خودداری کنید چون ممکن است اثر دارو تغییر کند.

۹ - چنانچه دارو را به طور مرتب مصرف می‌کنید، در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کرده‌بود ممکن است این دارو تغییر کند.

زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف این نوبت خودداری کنید و برنامه معمول دارویی خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را نیز دو برابر نکنید.

۱۰ - داروهای آتنی اسید ممکن است باعث کاهش اثر گاباپتین شوند. لذا این دارو باید با فاصله حداقل ۲ ساعت با آتنی اسیدها مصرف شود.

- مصرف در بارداری و شیردهی:

- بارداری:

کروه بارداری: کروه C.

مطالعات کافی در انسان معرفت نگرفته است. لذا در صورت بارداری حتماً پزشک را در جریان قرار دهید.

- شیردهی:

مطالعات کافی در مورد مصرف این دارو در دوران شیردهی وجود ندارد. در صورت شیردهی با پزشک مشورت نمایید.

موارد احتیاط:

۱ - در طول مصرف دارو با فواید منظم به پزشک مراجعت کنید تا پیش‌رفت درمان را در پرسی شود.

۲ - این دارو باعث تشديد اثرات تنباكو و دیگر داروهای مضعف CNS می‌شود. (داروهایی که باعث کاهش هشیاری و یا خواب آلوگی می‌شود) در صورت مصرف هر کدام از این داروها همزمان با مصرف گاباپتین حتماً پزشک یا دندانپزشک خود را آگاه نمایید.

مثالهای از این داروها عبارتند از:

آتنی هیستامین‌ها، داروهای سرماخوردگی یا تب یونجه، داروهای آرامیکننده ها شامل بی‌حس کننده‌های دندان.

کننده صرع، شل‌کننده‌های عضلانی، بی‌حس کننده‌های خواب آور، مخدرات خواب آور، باریتیورات‌ها یا سایر داروهای درمان

۳ - این دارو ممکن است باعث خواب آلوگی، گیجی یا تاری دید شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.

۴ - این دارو ممکن است روی تنجیه آرمایش پرتوتین ادرار اثر بگذارد. لذا حتماً پزشک مربوطه را در جریان مصرف گاباپتین قرار دهید.

۵ - هرگز مصرف دارو را بدون اجازه پزشک قطع نکنید. قطع ناگهانی آن ممکن است باعث بازگشت عالم بیمار شود.

۶ - به دلیل اختلال ایجاد وابستگی در مصرف همزمان این دارو با داروهای آرامیکننده حاوی اپیونیدها و خطر سو، مصرف، بایستی بیماران در طول درمان تحت پاییش منظم توسعه پزشک قرار گیرند.

مقدار و نحوه مصرف:

مقادیر ذکر شده در زیر مقدار متوسط مصرف است و مقدار دقیق را پزشک تعیین می‌کند.

■ برای مرع:

- بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال: ابتدا ۳۰۰ میلی گرم سه بار در روز مصرف می‌شود. بسته به نظر پزشک حداکثر دوز مصرفی روزانه دارو ۱۸۰۰ میلی گرم در روز باشد.

- کودکان ۵ تا ۱۲ سال: ۱۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در سه دوز منقسم.

- کودکان ۳ تا ۵ سال: ۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در سه دوز منقسم.

- برای کودکان کمتر از ۳ سال: مقدار و نحوه مصرف توسعه پزشک تعیین می‌شود.

- برای افراد مسن: مقدار و نحوه مصرف توسعه پزشک تعیین می‌شود با معمولاً باید بیشتر از ۶۰۰ میلی گرم سه بار در روز باشد.

■ برای دردهای عصبی:

- بزرگسالان و نوجوانان: روز اول ۳۰۰ میلی گرم، روز دوم ۳۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز، روز سوم ۳۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز. حداکثر مقدار مصرف ۱۸۰۰ میلی گرم در روز می‌باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود

لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر در اولین فرستاد پزشک مشورت کنید.

شایع در بزرگسالان: احساس عدم تعادل و حرکات غیرعادی و مداوم چشم‌ها.

شایع در اطفال ۳ تا ۱۲ سال: تغییرات تلقین، رفتار تهاجمی و اضطراب، عدم تمرز و کاهش پیشرفت درسی، احساس کاذب سرخوشی، گریه کردن، افزایش فعالیت، افسردگی، بروز

شدید احساسات، تغییرات سریع خلق و خو، بی‌قراری، بی‌اعتمادی.

مواد کمتر شایع:

مدفعه سیاه‌سینه، درد قفسه سینه، سرفه، افسردگی، تحریک پذیری، یا دیگر تغییرات خلقی، تب، کاهش حافظه، درد و تور در دست و پا، اشکال در ادرار

کردن، کوتاهی تنفس، گلودرد، زخم یا نقاط سفید در دهان یا لب، خستگی و ضعف غیرعادی، خونریزی غیرعادی، غدد متورم.

عوارض زیر ممکن است پس از مدتی بر طرف شود، در صورت تداوم هر یک از آنها به پزشک مراجعه کنید:

شایع: تاری دید یا دویینی، عالم شیشه سرماخوردگی، خواب آلوگی، خس خس سینه، توه، زوال عقل، کم شدن قدرت بدنه، درد پشت یا پهلو، تورم دست ها و

قسمت تحتانی پاهای، لرزش.

علائم مصرف بیش از حد اسهال، دویینی، خواب آلوگی، کندی، بریده بریده حرف زدن.

شایع نگهداری:

۱ - دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

۲ - دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی:

این دارو به مصرف گپسول های حاوی ۱۰۰ میلی گرم(گپسول های سفید رنگ) و ۳۰۰ میلی گرم(گپسول های زرد رنگ) ماده موثره گاباپتین توسعه شرکت

داروسازی فانک شیمی پارس تولید می‌شود.

هر ده گپسول در یک بیلستر و هر ۱۰ بیلستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می‌گیرد.

Gabapentin Capsule