

امپرازول تولیدی شرکت فاکت شیمی پارس به صورت کپسول های اتريک کتود خوراکی به رنگ آبی است. هر کپسول حاوی ۲۰ میلی گرم امپرازول است و در جعبه های حاوی دو بلیستر ۱۴ عددی عرضه می شود.

موارد مصرف:

- درمان زخم اثنی عشر
- جلوگیری از پیشرفت زخم اثنی عشر
- درمان زخم معده
- جلوگیری از پیشرفت زخم معده
- همراه با آنتی بیوتیک های مناسب ، ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری (هلیکوباکتر پیلوری) در بیماری زخم معده
- درمان ازوفازیت رفلاکس
- مدیریت طولانی مدت بیماریارن مبتلا به ازوفازیت رفلاکس بهبود یافته
- درمان بیماری رفلاکس معده و مری
- درمان سندرم زولینگر-الیسون

استفاده اطفال

- کودکان بالای ۱ سال داراری وزن بیشتر از ۱۰ کیلوگرم
- درمان رفلاکس مری
- درمان علائم سوزش سر دل و برگشت اسید در بیماری رفلاکس معده و مری
- کودکان و نوجوانان بالای ۴ سال
- همراه با آنتی بیوتیک ها در درمان زخم اثنی عشر ناشی از هلیکوباکتر پیلوری.

راهنمای عمومی:

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید .
- قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید :
- وجود هرگونه حساسیت
- استفاده از سایر داروها
- در صورت ابتلا به بیماری دیگر همچون اختلالات کبدی، پوکی استخوان، اختلال حافظه و لوپوس اریتروماتوز سیستمیک
- بارداری و شیردهی
- کودکان و سالمندان
- مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

بارداری:

استفاده از آن باید به مواردی محدود شود که منافع آن بیشتر از خطرات بالقوه برای جنین است ،در این دوران زیان آور شناخته نشده است

شیردهی:

امپرازول در شیر مادر وارد می شود بنابراین هنگام استفاده از آن در دوران شیردهی باید احتیاط کرد اگرچه زیان آور شناخته نشده است .

موارد منع مصرف :

امپرازول در بیمارارن با حساسیت شناخته شده به امپرازول یا سایر بنزوایمیدازول ها مثل اس امپرازول و لانزوپرازول منع مصرف دارد . همچنین در صورت حساسیت به هر یک از اجزا تشکیل دهنده دارو ممنوعیت مصرف وجود دارد.

هشدارها :

- اگر هنگام استفاده از این دارو دچار شکم درد ،تب مدفوع آبی که بهبود نمی یابد شدید فورا به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت امکان از مصرف طولانی مدت (بیش از ۱۴ روز) در بیمارارن سندرم مادرزادی طولانی بودن QT خودداری شود .
- اندازه گیری سطح منیزیم خون باید قبل و در طی درمان طولانی مدت امپرازول همراه با دیگوکسن در نظر گرفته شود.
- در مصرف طولانی مدت ممکن است منجر به کاهش منیزیم خون و کمبود ویتامین ب۱۲ شود.
- کسانی که در ریسک پوکی استخوان هستند باید به مقدار کافی کلسیم و ویتامین دی دریافت کنند.
- این دارو ممکن است علائم سرطان معده را بپوشاند.
- مقدار و نحوه مصرف :

۶۰ دقیقه قبل از غذا و با معده خالی همراه با یک لیوان آب مصرف شود و اگر یک بار در روز استفاده می شود قبل از اولین وعده روز میل شود .
گراونل های داخل کپسول نباید خرد یا جویده شود. کپسول را می توان باز کرد و دانه های آن را روی پوره سیب یا ماست ریخت و یا با آب میوه میل شود

مقدار مصرف

زخم خوش خیم معده و اثنی عشر :

۲۰ میلی گرم روزانه برای چهار هفته برای زخم اثنی عشری یا هشت هفته در زخم معده که در موارد شدید و عود کننده به ۴۰ میلی گرم روزانه می تواند افزایش یابد
 زخم اثنی عشری معده مرتبط با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی؛
 ۲۰ میلی گرم روزانه برای ۴ هفته در صورت عدم بهبود کامل می تواند تا ۴ هفته دیگر ادامه پیدا کند.
 جلوگیری از پیشرفت زخم اثنی عشری:

برای پیشگیری از پیشرفت زخم اثنی عشر در بیماران مبتلا به هلیکوباکتری پیلوری زمانی که امکان ریشه کنی هلیکوباکتری پیلوری وجود ندارد، دوز توصیه شده ۲۰ میلی گرم امپرازول یک بار در روز است. در برخی بیماران ممکن است دوز روزانه ۱۰ میلی گرم کافی باشد. در صورت شکست درمان، دوز را می توان به ۴۰ میلی گرم افزایش داد.

جلوگیری از عود زخم معده:
 برای پیشگیری از عود در بیماران مبتلا به زخم معده که پاسخ آنها ضعیف است، دوز توصیه شده امپرازول ۲۰ میلی گرم یک بار در روز است. در صورت نیاز، دوز را می توان به امپرازول ۴۰ میلی گرم یک بار در روز افزایش داد.

سندروم زولینگر-الیسون:
 دوز اولیه توصیه شده امپرازول ۶۰ میلی گرم در روز است. همه بیماران مبتلا به بیماری شدید و پاسخ ناکافی به سایر درمانها به طور موثر کنترل شده اند و بیش از ۹۰٪ از بیماران از دوزهای امپرازول ۲۰ تا ۱۲۰ میلی گرم در روز استفاده می کنند. هنگامی که دوز روزانه بیش از ۸۰ میلی گرم امپرازول باشد، دوز باید تقسیم شود و دوا سی به روز در روز تجویز شود.

برای ریشه کنی هلیکوباکتر:
 در انتخاب آنتی بیوتیک ها باید تحمل فردی دارو در نظر گرفته شده و مطابق با الگوهای مقاومت ملی، منطقه ای و محلی و دستورالعمل های درمانی انجام شود.
 • امپرازول ۲۰ میلی گرم + کلاریترامیسین ۵۰ میلی گرم + آموکسی سیلین ۱۰۰۰ میلی گرم، دو بار در روز به مدت یک هفته، یا
 • امپرازول ۲۰ میلی گرم + کلاریترامیسین ۲۵۰ میلی گرم (قابل جایگزین با ۵۰۰ میلی گرم) + مترونیدازول ۴۰۰ میلی گرم (یا ۵۰۰ میلی گرم یا تینیدازول ۵۰۰ میلی گرم)، هر کدام دو بار در روز به مدت یک هفته یا
 • امپرازول ۴۰ میلی گرم یک بار در روز + آموکسی سیلین ۵۰۰ میلی گرم + مترونیدازول ۴۰۰ میلی گرم (یا ۵۰۰ میلی گرم یا تینیدازول ۵۰۰ میلی گرم)، هر دو سه بار در روز به مدت یک هفته

بیماری رفلاکس اسید از معده به مری: ۲۰ میلی گرم روزانه برای ۴ هفته و می تواند برای ۴ الی ۸ هفته دیگر ادامه پیدا کند اگر بیمار کاملا بهبود پیدا نکرد در موارد مقاوم به درمان ۴۰ میلی گرم روزانه به مدت ۸ هفته، درمان نگهدارنده ۲۰ میلی گرم روزانه مدیریت طولانی مدت بیماران مبتلا به ازوفازیت ریفلاکس بهبود یافته برای مدیریت طولانی مدت بیماران مبتلا به ازوفازیت ریفلاکس بهبود یافته، دوز توصیه شده ۱۰ میلی گرم امپرازول یک بار در روز است. در صورت نیاز، دوز را می توان به امپرازول ۲۰-۴۰ میلی گرم یک بار در روز افزایش داد.

موهضامه مرتبط با اسید: بر مبنای پاسخ به درمان ۱۰-۲۰ میلی گرم روزانه برای ۲-۴ هفته

برای کودکان مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود اگر چه همه عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

عوارض یا شایع بیشتر: ناراحتی دستگاه گوارش (که شامل حالت تهوع، استفراغ، درد شکم، نفخ، اسهال، بیوست است) و سردرد است
 عوارض یا شایع کمتر: خشکی دهان، ادم محیطی، سرگیجه، اختلال در خواب، خستگی، احساس خارش یا سوزش روی پوست، درد مفاصل، درد در عضله، بثورات جلدی
تداخل دارویی و تغییر در پاسخ تست های آزمایشگاهی:

تجویز امپرازول ممکن است منجر به تداخل تست های آزمایشگاهی به ویژه تست های کروماگرافین^۸ سرم برای تومور های عمیق-غدد درون ریز، آزمایش ادرار برای تست های تتراهیدراکتاناپینول، آزمایش تحریک ترشح سکرترین و آزمایش های تشخیص هلیکوباکتر شود.
 امپرازول می تواند موجب افزایش غلظت پلاسمایی اس سیتالوپرام شده و ممکن است غلظت پلاسمایی دیگوکسین، تاکرولیموس، و اثر فنی توپین و کومارین ها را افزایش دهد

امپرازول اثر ضد پلاکتی کلویپدوگرل را کاهش می دهد و ممکن است غلظت پلاسمایی کلوزاپین و جذب ایتراکانازول را نیز کاهش دهد
 در صورت مصرف همزمان با باربیتورات ها مثل فنوباریتال، ریفاکسیم، وارفارین، دیورتیک های تیازیدی، خواب آور های آرام بخش، کربامازپین، متوترکسات، سفوروکسیم و همچنین سایر داروهای که در این بخش تداخل دارویی به آن اشاره شده پزشک خود را مطلع کن
شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد به دور از نور، رطوبت و دسترس اطفال نگه دارید.