

پنتوپرازول تولیدی شرکت فاتک شیمی پارس به صورت قرص های انتریک کوند خوراکی می باشد. هر قرص حاوی ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم پنتوپرازول است و در جعبه های حاوی دو بلیستر ۱۴ عددی عرضه می شود .

– راهنمای عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید .

در صورت مصرف طولانی مدت (بیش از یک سال) باید هر نوع نشانه و حالت جدید را به محض مشاهده به پزشک خود اطلاع دهید .

قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید و موارد زیر را اطلاع دهید :

۱. وجود هرگونه حساسیت به پنتوپرازول : دارو ها حاوی مواد غیر فعال دیگری هستند که در پروسه ساخت دارو استفاده میشوند لذا در صورت داشتن هرگونه سابقه واکنش های آلرژیک قبل از مصرف حتما با پزشک و یا داروساز خود صحبت کنید.

۲. استفاده از سایر داروها به ویژه داروهای : کتوکونازول ، ایتراکونازول ، مایکوفنولات موفتیل، وارفارین، آتازاناویر ، نلفیناویر ، متوترکسات

۳. در صورت ابتلا به بیماری دیگر

۴. بارداری و شیردهی

۵. کودکان و سالمندان

۶. کمبود منیزیم در خون

۷. ابتلا به سو جذب ویتامین B۱۲

از شکستن یا خرد کردن قرص اجتناب کنید و آن را به شکل سالم همراه با آب و قبل از غذا بلعید .

دارو را طبق دستور پزشک خود استفاده کرده و از تغییر و یا قطع مصرف دارو بدون مشورت با پزشک یا داروساز خودداری کنید .

در صورت فراموش کردن مصرف دارو ، به محض یادآوری آن را مصرف کنید . در صورتی که تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده است ، دوز بعدی را استفاده کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرفی جلوگیری کنید .

– موارد و مقادیر مصرف در بزرگسالان:

پنتوپرازول به دسته داروهای مهارکننده پمپ پروتون تعلق دارد و مقدار ترشح اسید معده را کاهش می دهد. برای درمان بیماری رفلاکس معده (GERD)، همراه با آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری ، زخم معده، زخم اثنی عشر، التهاب مری ناشی از ترشح اسید ، سندرم زولینگر-الیسون و موارد دیگر به تشخیص پزشک تجویز و مصرف می شود .

مقادیر ذکر شده در زیر مقدار متوسط مصرف می باشد و مقدار دقیق را پزشک تجویز می کند :

- درمان بیماری رفلاکس معده (GERD) :

یک قرص پنتوپرازول ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم یک یا دوبار در روز با توجه به شرایط بیمار و تشخیص پزشک

- درمان زخم ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری همراه با آنتی بیوتیک ها

یک قرص پنتوپرازول ۴۰ میلی گرم دو بار در روز همراه با آنتی بیوتیک ها

- درمان زخم معده و زخم اثنی عشر :

یک قرص پنتوپرازول ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم صبح ناشتا. در مواردی ممکن است به ۲ قرص پنتوپرازول ۴۰ میلی گرم در روز افزایش یابد.

- پیشگیری از زخم های اثنی عشر و معده.

یک قرص ۲۰ میلی گرم یک بار در روز

- درمان سندرم زولینگر-الیسون :

درمان با مصرف دو کپسول پنتوپرازول ۴۰ میلی گرم در روز شروع می شود و با مقدار مصرف تجویز شده توسط پزشک طبق شرایط بیمار درمان ادامه می یابد.

- مصرف در اطفال : مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک معالج تعیین شود .
- مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی کبد : مقدار مصرف روزانه نباید به بیش از ۲۰ میلی گرم در روز افزایش یابد .
- مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه : مقدار مصرف روزانه نباید به بیش از ۴۰ میلی گرم در روز افزایش یابد .
- مصرف در دوران بارداری و شیردهی: در صورت بارداری یا شیردهی شما تنها زمانی باید این دارو را مصرف کنید که پزشک شما تشخیص دهد مزایای درمان با این دارو بیش از مضرات احتمالی آن برای جنین یا نوزاد است .
- موارد منع مصرف و تداخلات دارویی:

پنتوپرازول در بیماران که حساسیت مفرط شناخته شده به پنتوپرازول و یا داروهای مشابه آن (مانند اس امپرازول، امپرازول و یا لنسوپرازول و ...) دارند منع مصرف دارد.

مصرف همزمان پنتوپرازول با داروهای: کتوکونازول، ایتراکونازول، مایکوفنولات موفتیل، وارفارین، آتازاناویر، نلغیناویر، متوترکسات تداخل دارد و در صورت مصرف این داروها باید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

این دارو ممکن است در برخی نتایج آزمایشگاهی تداخل ایجاد کند، اطمینان حاصل کنید که پرسنل آزمایشگاه و پزشک از استفاده شما از این دارو مطلع هستند.

- هشدارها و اقدامات احتیاطی

۱. پوشاندن علائم بدخیمی معده: پاسخ علامتی به درمان با پنتوپرازول نشانگر رفع مشکل بدخیمی معده نمی باشد.
- در صورت بروز کاهش وزن ناخواسته، استفراغ یا استفراغ خونی عودکننده یا مدفوع سیاه رنگ حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.
- کمیبود سیانوکوبالامین (ویتامین B۱۲): به طور کلی، درمان روزانه با هر گونه داروهای سرکوب کننده اسید در مدت زمان طولانی (به عنوان مثال، بیش از ۳ سال) ممکن است منجر به سو، جذب سیانوکوبالامین (ویتامین B۱۲) شود.
۲. شکستگی استخوان: مصرف دوز بالای روزانه و درمان طولانی مدت (یک سال یا بیشتر) با داروهای مهارکننده پمپ پروتون (PPI) ممکن است منجر به افزایش خطر شکستگی های مرتبط با پوکی استخوان در لگن، مچ دست یا ستون فقرات شود.
- هیپومنیزیمی: در اکثر بیماران، درمان هیپومنیزیمی نیاز به استفاده از مکمل منیزیم و یا قطع مصرف داروهای مهارکننده پمپ پروتون (PPI) دارد. برای بیمارانی که انتظار می رود تحت درمان طولانی مدت باشند یا پنتوپرازول را با داروهای مانند دیگوسکسین یا داروهای که ممکن است باعث هیپومنیزیمی شوند (به عنوان مثال، دیورتیک ها) مصرف می کنند، تومیه می شود سطح منیزیم قبل از شروع درمان با پنتوپرازول و به صورت دوره ای اندازه گیری شود.

- عوارض جانبی

- مانند تمام داروها مصرف پنتوپرازول نیز ممکن است باعث بروز عوارض جانبی شود .
- رایج ترین عوارض جانبی در بزرگسالان :
- سردرد، اسهال، تهوع، استفراغ، درد در ناحیه بالای شکم، نفخ، سرگیجه، احساس درد در مفاصل
- در صورت بروز هر یک از عوارض زیر به پزشک خود اطلاع دهید :
- راش پوستی، تحرق زیاد صورت، سختی در تنفس ، کمیبود ویتامین B۱۲، تورم صورت. زبان یا گلو
- در صورتی که عوارض جانبی دارو شدید شد و یا شما متوجه عارضه ای شدید که در این برگه راهنما وجود نداشت ، به پزشک خود یا دکتر داروساز اطلاع دهید .

- شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد به دور از نور و رطوبت. دور از دسترس کودکان نگهداری شود .