

این دارو به شکل قرص رونک دارموزتی رنگ حاوی ۱۲۰ میلی گرم بیسموت ساب سیترات است و در شرکت داروسازی فاتک شیمی ایران تولید و عرضه می‌گردد. قرص‌های رونک دار بیسموت ساب سیترات ۱۲۰ در بلیسترهای ۱۵۰ عددی بسته بندی می‌شود و هر جعبه حاوی چهار بلیستر می‌باشد.

#### راهنمای علومی:

این دارو برای درمان بیماری رفعی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در مواد مشابه یا تومیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو با پیشک یا داروساز خود مشورت کنید و مواد زیر را اطلاع دهید:

در صورت وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا سابقه حساسیت به سایر داروها و مواد غذایی

\* در صورت وجود تارسایی کلیه

#### مواد و مقادیر مصرف در بزرگسالان:

بیسموت ساب سیترات جهت درمان رختهای معده و روده و همراه با سایر داروها در درمان عفونت‌های گوارشی هلبکوبیاکتر پیلوئی مصرف می‌شود.

مقادیر مصرف دقیق هر دارو را پیشک تعیین می‌کند و در بیماران مختلف متفاوت می‌باشد.

مقادیر ذکر شده در زیر مقدار معمول مصرف می‌باشد:

مصرف دو بار در روز به طور که دو قرص نیم ساعت قبل از مباهنه و دو قرص نیم ساعت قبل از شام میل شود و یا مصرف چهار بار در روز به طور که نیم ساعت قبل از هروعده غذایی و دو ساعت بعد از شام هر بار یک عدد قرص میل شود.

طول دوره درمان هم توسط پیشک تعیین می‌شود و معمولاً دوره درمان یک ماه است.

#### مصرف در اطفال:

مصرف این دارو در اطفال تومیه نمی‌شود.

#### مصرف در دروان بارداری و شیرده:

در صورت بارداری یا شیرده شما تنها زمانی باید این دارو را مصرف کنید که پیشک شما تشخیص دهد مزایای درمان با این دارو بیش از مضرات احتمالی آن برای جنین یا نوزاد است.

#### نحوه مصرف:

از شکستن یا خرد کدن قرص اختبان کنید و آن را به شکل سالم همراه با آب و قبل از غذا بپلایید.

دارو را طبق دستور پیشک خود استفاده کرده و از تغییر و یا قطع مصرف دارو بدون مشورت با پیشک یا داروساز خودداری کنید.

در صورت فراموش کردن مصرف دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. در صورتی که تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده است، دوز بعدی را استفاده کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرف جلوگیری کنید.

#### مواد منع مصرف و تداخلات دارویی:

در بیمارانی که حساسیت مفتر شناخته شده به بیسموت ساب سیترات دارند منع مصرف دارد. دارو ها حاوی مواد غیر فعال دیگری هستند که در پروسه ساخت دارو استفاده می‌شوند.

لذا در صورت داشتن هرگونه سایقه واکنش‌های آлерژیک قبل از مصرف دارما بپیشک و یا داروساز خود محبث کنید.

در صورت داشتن همچنان مصرف این دارو خودداری کنید.

این دارو ممکن است جذب تنراسیکلین هارا کاهش دهد. در صورت لزوم حداقل با فاصله یک ساعت از هم مصرف شوند.

در صورت مصرف هم زمان با امیراژول ممکن است جذب این دارو افزایش یابد.

#### هشدارها و اقدامات احتیاطی:

مصرف طولانی مدت این دارو تومیه نمی‌شود. از مصرف بیش از مقدار و مدت تجویز شده خودداری نمایید.

هنگام مصرف این دارو از مصرف شیر یا آنتی اسید به مدت نیم ساعت قبل تا نیم ساعت بعد از خوردن دارو خودداری کنید.

از مصرف نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

## صرف بیش از حد:

صرف بیش از مقدار تومیه شده این دارو می تواند موجب آسیب چدی عصبی و آنسفالوپاتی شود.

از ویژگی های اصلی مسمومیت می توان به ناراحتی های کوارشی شدید، تهوع بیش از حد، راش های پوستی، التهاب فراگیر دهان، همراه با گیجی، اختلال در تعادل، اختلال در تکلم ، ایجاد نارسایی کلیه و آسیب به کبد اشاره کرد.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض جانبی نیز بشود. موارد زیر را چه ترین عوارض جانبی است که با صرف بیسیموموت سایپ سینترات در بزرگسال ممکن است دیده شود :

تبوع ، استغراق، بیوه شدن زبان ، سیاه شدن مدفوع

در صورتی که عوارض جانبی دارو شدید شد و یا شما متوجه عارضه ای شدید که در این برگه راهنمای وجود نداشت، به پزشک خود یا دکتر داروساز اطلاع دهید .

در صورت صرف اتفاقی بیش از مقدار تومیه شده سریعاً به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کنید .

## شرابیت نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتین گراد به دور از نور و رطوبت و دور از دسترس کودکان نگهداری شود .

در صورت بروز هرگونه عوارض جانبی از طریق وبسایت با آدرس [www.fatakchemie.com](http://www.fatakchemie.com) با ما در ارتباط باشید.